

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-8-5-68 793325

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

Ministère de l'Agriculture
(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier

Abonnement Annuel
25 francs

N° 92 - MAI 1968/I3

--:--:--:--:--:--

Montpellier le 3 mai 1968

NOTE : 2

MILDIU -

Des taches de Mildiou ont été découvertes, notamment par les observateurs du Centre de lutte contre le Mildiou, dans le quadrilatère St-Clément, St-Mamert, Ribaute, Tornac (Gard) ; nos correspondants de la vallée de l'Hérault nous en signalent à Agde dans les vignes inondées à cause des gelées. En dehors de ce dernier cas particulier, ce Mildiou est situé sur les feuilles de la base de souches établies dans des mouillères où l'eau a séjourné pendant plusieurs jours après les précipitations importantes qui se sont produites aux environs du 14 avril dans le nord des départements du Gard et de l'Hérault.

Atteignant et dépassant parfois 100 mm. ces pluies ont permis - aux points les mieux exposés - l'évolution des oeufs d'hiver dont les taches correspondantes apparaissent maintenant.

Des situations analogues peuvent exister au bas des pentes, depuis Canet, Vendémian, Montoulieu, Massillargues-Attuech, etc.

Par ailleurs des pluies ultérieures étant capables de multiplier les manifestations de la maladie, il y a donc lieu de :

- 1°) détruire, dès que possible, les organes verts inutiles situés au pied des souches établies en sols humides;
- 2°) effectuer un traitement sur les parcelles où la présence de la maladie a été constatée.

EUDEMIS -

Le vol de papillons d'Eudémis se poursuit ou se termine à Baixas, St-Jean Lasseille (Pyrénées-Orientales), St-André-de-Roquelongue, Douzens, Ginestas (Aude), Pont-St-Esprit (Gard), Lunel, Vérargues (Hérault).

Le traitement préventif (Arséniate de plomb, D D T) qui s'y rapporte actuellement sera renouvelé dix jours après.

L'application de produits curatifs est liée à l'apparition des premiers dégâts.

COCHYLIS -

Les premiers papillons de Cochylis apparaissent à Pont-St-Esprit ; on n'aura recours à l'emploi du Carbaryl (Sevin) ou d'un ester phosphorique que dans une quinzaine de jours.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avvertissements Viticoles :

P304